予防接種スケジュール表

2013年　1月　現在　　作成 ： ゆめきゃんぱす

この色は標準的な
接種年齢です

		ワクチンの種類	回数	0歳 1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	1歳6ヶ月	3歳	4歳	5歳～年長	9～10歳	小6	中1	高3
定期予防接種	生	BCG	1			←	①	→															
	不活化	三種混合	5			三種混合は20日～56日の間隔をあけて3回接種 ①	②	③							3回接種終了1年後	④					⑤		
	不活	ポリオ（単独）	4			ポリオは20日の間隔をあけて3回接種 ①	②	③							3回接種終了1年後	④							
	生	麻しん・風しん	4												①				②				
	不活化	日本脳炎	4														①			②		③	④
	不活	ヒブ	4		ヒブは4～8週の間隔をあけて3回接種 ①		②	③						1回接種後約終了1年		④							
	不活	小児用肺炎球菌	4		①		②	③					④										
任意予防接種	生	ロタウィルス	2 3		① ①		② ②	③	ロタ：1価（2回接種）と5価（3回）とあ							④							
	不活化	B型肝炎	3		①	②		③															
	生	おたふく	2												①								
	生	みずぼうそう	2									みずぼうそうの追加接種は1回目種後約3ヶ月はあけましょう			①	②							
	不活化	インフルエンザ	毎秋																				

- 生ワクチンは接種後27日以上、間をおいて別の予防接種を行い、不活化ワクチンは接種後6日以上、間をおいて別の予防接種を行ってください。
- 同時接種をうまく利用し、病気の流行に応じてかかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。